

# Nutri DG®

## Greens - SGN 75

# 13 + 0 + 26

(13 + 0 + 21.6)

# 100%

## MUtech™

<b>USA/INT</b>	<b>13 + 0 + 26</b>
13%	Total Nitrogen (N) 2.0% Urea Nitrogen 6.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
26%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
8.8%	Total Sulfur (S) from sulfate

**Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

<b>UK/EC</b>	<b>EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE 13 + 0 + 26</b>
13.0%	Total nitrogen (N) 2.0% Ureic nitrogen (N) 11.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 6.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
26.0%	Potassium oxide (K <sub>2</sub> O) water soluble
22.0%	Sulphur trioxide (SO <sub>3</sub> ) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate  
Throsk, Stirling  
Scotland FK7 7NP

**Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

<b>France/EC</b>	<b>ENGRAIS CE Engrais NK contenant de l'urée formaldéhyde action lente 13-0-26</b>
13.0%	Azote (N) total
2.0%	Azote (N) uréique
11.0%	Azote (N) organique de synthèse de l'urée formaldéhyde dont 6.5% soluble à 20°C dont 2.4% soluble à 100°C mais insoluble à 20°C dont 2.1% insoluble à 100°C
26.0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
22.0%	Anhydride sulfurique (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.  
21 Rue du Saint-Sépulcre  
62560 Saint Omer France

#### Dose d'emploi

Cet engrais est destiné à la fertilisation d'entretien des gazons et permet un bon développement. L'azote organique de synthèse permet une mise à disposition de l'azote étalée dans le temps, en évitant une pousse irrégulière. Apporter de 150 à 200 kg/ha plusieurs fois pendant la saison de croissance du gazon. Cet engrais est particulièrement recommandé pour les périodes les plus chaudes : sa forte concentration en azote organique de synthèse évitera un excès d'azote assimilable. La forte proportion de potasse aidera le gazon à surmonter les stress  
L'engrais sera appliqué uniformément sur toute la surface. L'humidité présente sur le feuillage ou un léger arrosage permettrons un défillement très rapide des granulés grâce à la technologie NUTRI DG (granulé dispersible).

<b>Deutschland</b>	<b>13-0-26 NutriDG</b>
<b>Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012:</b>	
<b>NK-Dünger, 13-26 mit Spurennährstoffen</b>	
13,0 %	N Gesamtstickstoff 2,0 % N Carbamidstickstoff 11,0 % N Formadehydharstoff 6,5 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharstoff 4,5 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
26,0 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
<b>Nettogewicht: 20 kg</b>	
<b>Inverkehrbringer:</b> TURF Handels GmbH., Am Hartboden 48, A – 8101 Gratkorn	
<b>Hinweise zur sachgerechten Lagerung:</b> In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren. <b>Anwendung:</b> Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m <sup>2</sup> auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor.	
Für alle Zier- und Sportrasenflächen.	

<b>Österreich</b>	<b>13-0-26 NutriDG</b>
<b>Deklaration nach der Österreichischen Düngemittelverordnung 2004 (zuletzt geändert am 07.06.2022):</b>	
<b>Mineralischer NK-Dünger mit Spurennährstoffen</b>	
13,0 %	N Gesamtstickstoff 2,0 % N Carbamidstickstoff 11,0 % N Formaldehydharstoff 6,5 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharstoff 4,5 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
26,0 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
Enthält 85 % Langzeitstickstoff.	
<b>Hinweise zur sachgerechten Lagerung:</b> In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren. <b>Anwendung:</b> Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m <sup>2</sup> auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor.	
<b>Sicherheitshinweis:</b> Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen.	
<b>Anwendungsbereich:</b> Hobbygarten, Gala-Bau, Golf- und Sportanlagen	
<b>Hersteller:</b> TURF Handels GmbH, Am Hartboden 48, AT8101 Gratkorn	
<b>Gewicht: 20 kg</b>	

<b>Italia</b>	<b>CONCIME CE Concime NK (S) 13-26 (22) contenente urea formaldeide a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione</b>
13%	Azoto (N) totale
2%	Azoto (N) ureico
11%	Azoto (N) dell'urea formaldeide
6,5%	Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda
2,4%	Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda
26%	Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O), solubile in acqua
22%	Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ), solubile in acqua
Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.	
Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)	
Distribuito da: EMERALD s.r.l.	
<b>Dose: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b>	
<b>Indicazioni per l'uso:</b> applicare 15–30 g/m <sup>2</sup> di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.	

<b>Sverige</b>	<b>EG-GÖDSELMEDEL NK-GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER UREA FORMALDEHYD 13 + 0 + 21.6</b>
13,0%	Total andel kväve (N) 2,0% Kväve (N) som urea 11,0% Urea Formaldehyd 6,5% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i kallt vatten 2,4% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i varmt vatten
21,6%	Kalium (K) vattenlösligt
8,8%	Svavel (S) vattenlösligt
Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.	
Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullunnet 50 1570 Dilling, NORGE	
<b>Dosering: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b>	
<b>Bruksanvisning:</b> Tillsätt 15–30 g/m <sup>2</sup> av produkten till aktivt växande torv. Tillsätt produkten till torra löv. Omedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispergera partiklar in i rotzonen. På grund av variationer i temperatur och vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersion i rotzonen. Partikel färg kan variera från parti till parti. Tillsätt endast en liten mängd om temperatur överstiger 25°C och vattna omedelbart efter gödsling. Förvara på en ren, torr plats. Förslut öppnad förpackning genom att vika ned och fästa den övre kanten. Använd endast rena, torra gödselspridare. Lämn inte kvar oanvänd produkt i gödselspridarna.	

<b>Norge</b>	<b>EC GJØDNING NK GJØDNING INNEHOLDER UREA FORMALDEHYD 13 + 0 + 21,6</b>
13,0%	Samlet Nitrogen (N) 2,0% Ureanitrogen (N) 11,0% Ureaformaldehyd 6,5% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i kaldt vann 2,4% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i varmt vann
21,6%	Kalium (K) vannoppløselig
8,8%	Svovel (S) vannoppløselig
Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.	
Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORWAY	
<b>Påføringsrate: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b>	
<b>Bruksanvisning:</b> Påfør produktet på voksende torv med 15–30 g/m <sup>2</sup> . Påfør på tørt løvverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vanning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Påfør kun med lave rater hvis temperaturen overskrider 25°C og vann øyeblikkelig etter påføring. Lagre produktet på et tørt, rent sted. Tett igjen den åpne posen etter bruk ved å brette ned toppen og forvar den på et sikkert sted. Bruk bare rene, tørre spreder. Ikke la rester av produktet bli liggende i sprederen.	

<b>Denmark</b>	<b>EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREA FORMALDEHYD 13 + 0 + 21.6</b>
13,0%	Samlet kvælstof (N) 2,0% Ammoniumkvælstof (N) 11,0% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med 6,5% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand 2,4% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand
21,6%	Kalium (K) vandopløseligt
8,8%	Svovl (S) vandopløseligt
Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.	
Importeret i Danmark af: Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORWAY	
<b>Applikationsrater: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b>	
<b>Bruksanvisninger:</b> Kom produktet på aktivt voksende grønsvæv ved 15–30 g/m <sup>2</sup> . Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rotzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rotzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25 °C og overrvis umiddelbart efter påføring. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegel den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spreder. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.	

<b>België</b>	<b>EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE 13 + 0 + 26</b>
13,0%	totaal stikstof (N) 2,0% ureumstikstof (N) 11,0% stikstof (N) fra ureumformaldehyde, waarvan: 6,5% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 2,4% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water
26,0%	kaliumoxide (K <sub>2</sub> O), in water oplosbaar
22,0%	zwaveltrioxide (SO <sub>3</sub> ), in water oplosbaar
Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.	
Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkeilaan 14 2950 Kapellen - België	
<b>Aan te brengen hoeveelheden: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b>	
<b>Gebruiksaanwijzing:</b> product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–30 g/m <sup>2</sup> . Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm inwateren om deeltjes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variaties in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenspoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltjes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltjes kan van partij tot partij variëren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.	

<b>Belgique</b>	<b>ENGRAIS CE ENGRAIS NK CONTENANT DE L'URÉE FORMALDEHYDE 13 + 0 + 26</b>
13,0%	Azote (N) total 2,0% Azote (N) uréique 11,0% Azote (N) de l'urée formaldéhyde dont 6,5% Azote (N) de l'urée formaldéhyde uniquement soluble dans l'eau froide 2,4% Azote (N) de l'urée formaldéhyde uniquement soluble dans l'eau chaude
26,0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
22,0%	Anhydride sulfurique (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau
Pauvre en chlore. A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose prescrite.	
Importé en Belgique par: Sports Management bvba Lorkeilaan 14 2950 Kapellen Belgique	
<b>Taux d'application : 15 à 30 g/m<sup>2</sup> (150 à 300 kg/ha)</b>	
<b>Mode d'emploi :</b> Appliquer le produit à la dose de 15 à 30 grammes par m <sup>2</sup> pour obtenir une croissance optimale du gazon. Appliquer par temps sec et sur un feuillage sec. Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5 mm d'eau pour disperser les particules dans la zone de racines. En raison des variations de température et du pH de l'eau, les meilleurs résultats sont obtenus en divisant l'irrigation en 2 applications à 10-15 minutes d'écart. Ceci permettra une plus grande dispersion des particules dans la zone des racines. La couleur des particules peut varier d'un lot à un autre. En cas de chaleur supérieure à 25°C, minorer la dose et arroser immédiatement après application. Conserver le produit dans un endroit propre et sec. Réformer soigneusement le sac en repliant la partie supérieure et en l'attachant. Appliquer avec un épandeur propre et sec. Ne pas laisser de produit inutilisé dans les épandeurs.	

<b>España/CE</b>	<b>ABONO CE ABONO COMPLEJO Abono NK contenido urea formaldehido 13 + 0 + 26</b>
13,0%	Nitrógeno total (N) 2,0% de nitrógeno ureico (N) 11,0% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehido 6,5% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehido soluble en agua fría 2,4% Nitrógeno (N) de la urea formaldehido soluble únicamente en agua caliente
26,0%	de óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua
22,0%	de azufre (SO <sub>3</sub> ) soluble en agua
Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.	
Importador para España:	
<b>Dosis de aplicación: 15–30 grs/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b>	
<b>Instrucciones de uso:</b> Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Dosis recomendada 15–30 gr/m <sup>2</sup> . Aplicar cuando la hoja esté seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si la temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.	

<b>Eire/EC</b>	<b>EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE 13 + 0 + 21.6</b>
13.0%	Total nitrogen (N) 2.0% Ureic nitrogen (N) 11.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 6.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
21.6%	Potassium (K) water soluble
8.8%	Sulphur (S) water soluble
Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.	
Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP	
<b>Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)</b>	
<b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m <sup>2</sup> . Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

<b>Taiwan (R.O.C.)</b>	<b>菁好新世代新甲菁好(DG 13-0-26)</b>
肥料登記證字號: 肥進(複)字第 0128033 號	
肥料品目: 複合肥料 (6-01)	
國外廠牌商品名稱: 13-0-26 NUTRI DG 100% MUtech	
保證成份: 全氮13.0%、水溶性氧化錳26.3%	
使用方法: 於作物生長季節春季至秋季末適量施灑。成長中的草皮每平方米施用15~30公克, 施用在乾的葉面。施肥後需澆水10-20分鐘。	
使用量: 15~30公克/平方公尺(每分地)15-30 kg	
包裝方式: 袋裝 淨重: 20 kg	
有效期限: 4年 批號: 請詳見包裝	
製造日期: 請詳見包裝 電話: 04-22135266	
總代理: 菁修企業有限公司	
地址: 台中市東區自由路四段210號	
製造地: 美國	
製造廠商: THE ANDERSONS, INC.	
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

<b>Warning</b> MAY CAUSE EYE IRRITATION MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION	
<b>Precautionary Statements</b> Keep out of reach of children. Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label on hand. Call a poison center/physician if unwell. If on skin, wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations.	
<b>First Aid</b>	If swallowed: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, but DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical attention.
If on skin:	Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse.
If in eyes:	Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists.
If inhaled:	Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.

<b>Australia</b>	<b>13 + 0 + 21.6</b>
13%	Total Nitrogen (N) 2.0% Urea Nitrogen 6.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
21.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
8.8%	Total Sulfur (S) from sulfate

**Application rates: 1.5–3.0 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

<b>New Zealand</b>	<b>13 + 0 + 21.6</b>
13%	Total Nitrogen (N) 2.0% Urea Nitrogen 6.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
21.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
8.8%	Total Sulfur (S) from sulfate

**Application rates: 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m <sup>2</sup>	20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>
<b>Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)</b> Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.0 m	1 1/2	J 1/2	K 1/2	L 1/4
<b>SSD Drop Spreader</b> - Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	0.9 m	3	3 3/4	4 1/4	5
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						



Manufactured by:  
The Andersons, Inc.  
P. O. Box 119  
Maumee, OH 43537  
U.S.A.  
www.andersonsplantnutrient.com

# 20 kg/net

# 10005456

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.