

# Nutri DG®

## Greens - SGN 75

# 18 + 9 + 18 + Fe, Mn

## (18 + 4 + 14.9 + Fe, Mn)

# 60% MUtech™

USA/INT	18 + 9 + 18 + Fe, Mn
18.0%	Total Nitrogen (N) 4.2% Ammoniacal Nitrogen 4.7% Urea Nitrogen 3.7% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas 5.4% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
9.0%	Available Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) from ammonium phosphate
18.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
8.6%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.14%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

### Application rates: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland	18-9-18 NutriDG
<b>Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012:</b> <b>NPk-Dünger, 18-9-18 mit Spurennährstoffen</b>	
18,0 %	N Gesamtsickstoff 1,9 % N Ammoniumstickstoff 6,9 % N Carbamidstickstoff 9,2 % N Formaldehydharstoff 5,4 % N kaltwasserlöslicher Formalddehydharstoff 3,8 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
9,0 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> neutralammonitrat- und wasserlösliches Phosphat 8,9 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> wasserlösliches Phosphat
18,0 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
2,0 %	Fe Eisen
1,0 %	Mn Mangan

**Nettomasse: 20 kg**  
**Inverkehrbringer:** TURF Handels GmbH, Am Hariboden 48, A – 8101 Gratkorn

**Hinweise zur sachgerechten Lagerung:** In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerschbar aufbewahren.

**Anwendung:** Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m<sup>2</sup> auf möglichst trockene Bestände von Golfgrüns oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

Für alle Zier- und Sportrasenflächen.

Norge	EC GJØDNING NK GJØDNING INNEHOLDER UREA-FORMALDEHYD MED Mn 18 + 4 + 14.9 + Mn
18,0%	Total Nitrogen (N) 4,2% Ammoniaknitrogen (N) 4,7% Urea nitrogen (N) 9,1% Ureaformaldehyd 5,4% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i kaldt vann 2,0% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i varmt vann
4,0%	Fosfor (P) oppløselig i nøytralt ammoniumcitrat og vann med 3,7% oppløselig i vann
14,9%	Kalium (K) oppløselig i vann
8,6%	Svovel (S) oppløselig i vann
0,14%	Mangan (Mn) oppløselig i vann

Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS  
Gullfurnet 50  
1570 Dilling, NORGE

### Påføringsrate: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Bruksanvisning:** Påfør produktet på voksende torv med 15-30 g/m<sup>2</sup>. Påfør på tørt løvverk. Umiddelbart etter påføring, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispersere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultatene oppnådd ved å splitte vannning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Påfør kun med lave rater hvis temperaturen overskrider 25°C og vann øyeblikkelig etter påføring. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved å feie eller blåse for å unngå misfarging. VASK IKKE BORT MED VANN. Lagre produktet på et tørt, rent sted. Tett igjen den åpne posen etter bruk ved å brette ned toppen og forvar den på et sikkert sted. Bruk bare rene, tørre spredere. Ikke la rester av produktet bli liggende i spredere.

España/CE	ABONO CE ABONO COMPLEJO ABONO NPK contenido urea formaldehido con Mn 18 + 9 + 18 + Mn
18,0%	Nitrógeno total (N) 4,2% Nitrógeno amoniacal (N) 4,7% de nitrógeno ureico (N) 9,1% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehído 5,4% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehido soluble en agua fría 2,0% Nitrógeno (N) de la urea formaldehido soluble únicamente en agua caliente
9,0%	Pentóxido de fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble en citrato amónico neutro y agua con 8,5% soluble en agua P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
18,0%	de óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua
21,5%	de azufre (SO <sub>2</sub> ) soluble en agua
0,14%	Manganeso (Mn) soluble en agua

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

### Dosis de aplicación: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 Kg/ha)

**Instrucciones de uso:** Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si la temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.

Australia	18 + 4 + 14.9 + Fe, Mn
18.0%	Total Nitrogen (N) 4.2% Ammoniacal Nitrogen 4.7% Urea Nitrogen 3.7% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas 5.4% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
4.0%	Available Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) from ammonium phosphate
14.9%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
8.6%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.14%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

### Application rates: 1.5 - 3.0 kg/100 m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 1.5 - 3.0 kg/100 m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn 18 + 9 + 18 + Mn
18.0%	Total nitrogen (N) 4.2% Ammoniacal nitrogen (N) 4.7% Ureic nitrogen (N) 9.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 5.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
9.0%	Phosphorus pentoxide (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble in neutral ammonium citrate and water with 8.5% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
18.0%	Potassium oxide (K <sub>2</sub> O) water soluble
21.5%	Sulphur trioxide (SO <sub>2</sub> ) water soluble
0.14%	Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate  
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

### Application rates: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Österreich	18-9-18 NutriDG
<b>Deklaration nach der Österreichischen Düngemittelverordnung 2004 (zuletzt geändert am 07.06.2022):</b> <b>Mineralischer NPk-Dünger mit Spurennährstoffen</b>	
18,0 %	N Gesamtsickstoff 1,9 % N Ammoniumstickstoff 6,9 % N Carbamidstickstoff 9,2 % N Formaldehydharstoff 5,4 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharstoff 3,8 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
9,0 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> neutralammonitrat- und wasserlösliches Phosphat 8,9 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> wasserlösliches Phosphat
18,0 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
2,0 %	Fe Eisen
1,0 %	Mn Mangan

Einhält 51 % Langzeitsickstoff.

**Hinweise zur sachgerechten Lagerung:** In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerschbar aufbewahren. **Anwendung:** Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m<sup>2</sup> auf möglichst trockene Bestände von Golfgrüns oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

**Sicherheitshinweis:** Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen.

**Anwendungsbereich:** Hobbygarten, Gala-Bau, Golf- und Sportanlagen

**Hersteller:** TURF Handel GmbH, Am Hariboden 48, A-8101 Gratkorn

Gewicht: 20 kg

Denmark	EC KUNSTGØDNING NPK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREA-FORMALDEHYD MED Mn 18 + 4 + 14.9 + Mn
18,0%	Samlet kvælstof (N) 4,2% Ammoniumkvælstof 4,7% Ureakvælstof 9,1% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med 5,4% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand 2,0% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand
4,0%	Fosfor (P) opløseligt i neutral ammoniumcitrat og vand med 3,7% vandopløseligt P
14,9%	Kalium (K) vandopløseligt
8,6%	Svovl (S) vandopløseligt
0,14%	Mangan (Mn) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende doser må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS  
Gullfurnet 50, 1570  
1570 Dilling, NORGE

### Applikationsrate: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Brugsanvisninger:** Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-30 g/m<sup>2</sup>. Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføring, påføres mindst 5 mm vand at dispersere partikler i rotzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rotzonen. Partikkel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25°C og oversis umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette bet og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feie eller blåse for at undgå pletter. VASK IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsøg den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.

Eire/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn 18 + 4 + 14.9 + Mn
18.0%	Total nitrogen (N) 4.2% Ammoniacal nitrogen (N) 4.7% Ureic nitrogen (N) 9.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 5.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
4.0%	Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 3.7% water soluble P
14.9%	Potassium (K) water soluble
8.6%	Sulphur (S) water soluble
0.14%	Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate  
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

### Application rates: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	18 + 4 + 14.9 + Fe, Mn
18.0%	Total Nitrogen (N) 4.2% Ammoniacal Nitrogen 4.7% Urea Nitrogen 3.7% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas 5.4% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
4.0%	Available Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) from ammonium phosphate
14.9%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
8.6%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.14%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

### Application rates: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15 - 30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	Engrais CE Engrais NPK contenant de l'urée formaldéhyde action lente 18-9-18
18.0%	Azote (N) total 4.2% Azote (N) ammoniacal 4.7% Azote (N) uréique 9.1% Azote (N) organique de synthèse de l'urée formaldéhyde dont 5.4% soluble à 20°C dont 2.0% soluble à 100°C mais insoluble à 20°C dont 1.7% insoluble à 100°C
9.0%	Anhydride phosphorique (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) total 9.0% dont Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre 8.5% dont Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau
18.0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
21.5%	Anhydride sulfurique (SO <sub>2</sub> ) soluble dans l'eau

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.  
21 Rue du Saint Sépulcre  
92560 Saint Omer France

### Dose d'emploi

Cet engrais est destiné à la fertilisation des gazons et permet de fournir les éléments majeurs nécessaires à un bon développement, d'une manière équilibrée. L'azote organique de synthèse permet une mise à disposition de l'azote élargie dans le temps. Apporter de 150 à 200 kg/ha plusieurs fois pendant la saison de croissance du gazon. L'engrais sera appliqué uniformément sur toute la surface. L'humidité présente sur le feuillage ou un léger arrosage permettront un détellement très rapide des granulés grâce à la technologie NUTRI DG (granulé dispersible).

Italia	FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NPK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE CON Mn 18 + 9 + 18 + Mn
18,0%	Totale azoto (N) 4,2% Azoto ammoniacato (N) 4,7% Azoto ureico (N) 9,1% Azoto (N) da urea formaldeide con 5,4% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda 2,0% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda
9,0%	di pentossido di fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 8,5% di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua
18,0%	di ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua
21,5%	di triossido di zolfo (SO <sub>2</sub> ) solubile in acqua
0,14%	di manganese (Mn) solubile in acqua

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importatore (fabricante) da: BOTTOS s.r.l.  
via Lusevera, 1 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

### Tassi di applicazione: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Istruzioni per l'uso:** applicare 15-30 g/m<sup>2</sup> di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente usando una scopa applicatore o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE; BEVAT Mn 18 + 9 + 18 + Mn
18,0%	totaal stikstof (N) 4,2% ammoniakstikstof (N) 4,7% ureumstikstof (N) 9,1% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 5,4%stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 2,0%stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water
9,0%	Fosforpentoxide (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) oplosbaar in neutraal ammoniumcitrat en water, met 8,5% in water oplosbaar P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
18,0%	kaliumoxide (K <sub>2</sub> O), in water oplosbaar
21,5%	zweveltrioxide (SO <sub>2</sub> ), in water oplosbaar
0,14%	mangaan (Mn), in water oplosbaar

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba  
Lorkenlaan 14  
2950 Kapellen - België

### Aan te brengen hoeveelheden: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Gebruiksaanwijzing:** product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-30 g/m<sup>2</sup>. Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm irwateren om deeltes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variabelen in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenpoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltes kan van parti tot parti variëren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorst deeltes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.

Taiwan (R.O.C.)	菁好牌菁美肥 (DG 18-9-18)
肥料登記證字號: 肥進(複)字第 0128073 號 肥料品目: 複合肥料 (6-01) 國外廠牌商品名稱: THE ANDERSONS NUTRI DG DISPERSING GRANULE TECHNOLOGY 18-9-18 保證成份: 全氮18.0%, 檸檬酸溶性磷9.0%, 水溶性氧化鉀18.0%	
成性狀: 固態, 顆粒狀 使用方法: 以15-30g/m <sup>2</sup> 施用本產品於成長草皮。施用於乾的草皮表面, 施用後澆水3-4mm。當溫度超過25°C時, 需以低比率施用之, 且施用後需立即澆水10-20分鐘。 使用量: 15-30 g/m <sup>2</sup> (每分地15-30 kg)。 包裝方式: 袋裝 淨重: 20 kg 有效期限: 4年 批號: 請詳見包裝 製造日期: 請詳見包裝 批號: 請詳見包裝 電話: 04-22135266 總代理: 菁修企業有限公司 地址: 台中市東區自由路四段210號 製造地: 美國 製造廠商: THE ANDERSONS, INC. P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m <sup>2</sup>	20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>
Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.0 m	1 3/4	J 3/4	K 3/4	L 1/2
SSD Drop Spreader - Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	0.9 m	3 1/2	4	4 1/2	5 1/4
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						

**The Andersons**  
Manufactured by:  
The Andersons, Inc.  
P. O. Box 119  
Maumee, OH 43537  
U.S.A.  
www.andersonsplantnutrient.com

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.



### Attention

**H302 Nocif en cas d'ingestion**  
**H315 Provoque une irritation cutanée**  
**H319 Provoque une sévère irritation des yeux**  
**H335 Peut irriter les voies respiratoires**  
P261 Éviter de respirer les poussières  
P264 Se laver soigneusement après manipulation  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
P280 Porter un équipement de protection des yeux et du visage.  
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.  
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.  
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
P303 Rincer la bouche  
P501 Eliminer le contenu selon les lois et règlements en vigueur.

Sverige	EG-GÖDSELMEDEL NPK-GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER UREA FORMALDEHYD MED Mn 18 + 4 + 14.9 + Mn
18,0%	Total andel kväve (N) 4,2% Ammoniakkväve (N) 4,7% Kväve (N) som urea 9,1% Urea formaldehyd 5,4% från urea-formaldehyd endast lösligt i kallt vatten 2,0% från urea-formaldehyd endast lösligt i varmt vatten
4,0%	Fosfor (P) lösligt i neutralt ammoniumcitrat och vatten med 3,7% P vattenlösigt
14,9%	Kalium (K) vattenlösigt
8,6%	Svavel (S) vattenlösigt
0,14%	Mangan (Mn) vattenlösigt

Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB  
c/o Floratine Norge AS  
Gullfurnet 50  
1570 Dilling, NORGE

### Dosering: 15-30 g/m<sup>2</sup> (150-300 kg/ha)

**Bruksanvisning:** Tillsätt 15-30 g/m<sup>2</sup> av produkten till aktivt växande torv. Tillsätt produkten till torra löv. Omedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispersera partiklar i rotzonen. På grund av variationer i temperatur och vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersionen i rotzonen. Partikkel färg kan variera från parti till parti. T